令和8年度　雲南市定期予防接種（A類疾病）スケジュール表

…標準的な接種年齢　…接種対象年齢（公費負担対象）　…同時接種可能　R8.4月

接種時期（満年齢） / ワクチン名（ワクチンの種類、接種回数）				出生前	出生	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
定期接種（公費負担対象）	ＲＳウイルス	不活化	1回	①	接種日現在で妊娠28週から36週の妊婦が対象です。 ①は、妊娠ごとに接種します。																												
	ロタウイルス ロタリックス（1価）	経口生	2回				① 27日以上	② 空けて																									
	ロタウイルス ロタテック（5価）	経口生	3回				① 27日以上	② 空けて	③																								
	小児用肺炎球菌	不活化	4回				初回 ① 27日以上	② 空けて	③								追加 ④																
	Ｂ型肝炎	不活化	3回				初回 ① 27日以上	② 空けて					追加 ③																				
	５種混合（ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ、ヒブ）	不活化	4回				1期初回 ① 27日以上	② 空けて	③								1期追加 ④																
	ＢＣＧ	注射生	1回							①																						
	麻しん・風しん（ＭＲ）	注射生	2回														1期 ① 27日以上				2期 ②											
	水痘	注射生	2回														①② 27日以上	空けて														
	日本脳炎	不活化	4回																1期初回 ① ② 27日以上	空けて	③				2期 ④							
	２種混合（ＤＴ）（ジフテリア、破傷風）	不活化	1回																							2期 ①						
	ヒトパピローマウイルス感染症（ＨＰＶ） シルガード9（9価）	不活化	3回																								① 6か月以上	空けて	② ③			
任意接種	おたふくかぜ	生	2回														①				②										
	インフルエンザ	不活化	年齢による																													

- ①②③：接種日現在で妊娠28週から36週の妊婦が対象です。①は、妊娠ごとに接種します。
- ロタリックス（1価）：生後6週から24週までに接種します。生後14週6日までに初回接種を行います。①②は、27日以上空けて接種します。
- ロタテック（5価）：生後6週から32週までに接種します。生後14週6日までに初回接種を行います。①②③は、それぞれ27日以上空けて接種します。
- 小児用肺炎球菌：生後2か月から5歳までに接種します。初回①～③は、それぞれ27日以上空けて接種します。追加④は、③の後、60日以上空けて（1歳以上で）接種します。※①が生後7か月以上、②が1歳を超えた、③が2歳を超えたときは、接種回数が変わります。
- Ｂ型肝炎：生後1歳までに接種します。初回①②は、27日以上の間隔をおいて2回接種します。追加③は、①から139日以上空けて1回接種します。
- ５種混合：生後2か月から7歳6か月未満に接種します。1期初回①～③は、生後2か月から7か月までの間に、20日～56日の間隔で接種します。1期追加④は、③から6か月以上1年半の間に接種します。
- ＢＣＧ：生後1歳までに接種します。①は、生後5か月から8か月未満の間に接種します。
- 麻しん・風しん（ＭＲ）：1期①は、1歳の間に接種します。2期②は、年長児に接種します。※小学校就学後は接種できません。
- 水痘：1歳から3歳までの間に接種します。①は、生後12か月から15か月までの間に接種します。②は、①から6か月から12か月までに間に接種します。
- 日本脳炎：生後6か月から90か月（7歳6か月）の間に接種します。1期初回①②は、6日以上空けて2回接種します。1期追加③は、②から6か月以上概ね1年を空けて接種します。9歳から13歳までに接種します。2期④は、小学4年生に接種します。
- ２種混合（ＤＴ）（ジフテリア、破傷風）：11歳から13歳までに接種します。2期①は、小学6年生に接種します。
- ヒトパピローマウイルス感染症（ＨＰＶ） シルガード9（9価）：小学校6年生から高校1年生の女子が対象です。①②は、中学1年生の間に①の後、6か月以上空けて接種します。※①を15歳以上で始めた場合は、3回接種となり、①から2か月空けて②を接種し、その後、①から6か月空けて③を接種します。
- おたふくかぜ：①　②
- インフルエンザ：1シーズンに2回接種　1シーズンに1回接種