

サクラや果樹などを
まもろう！

くじょ れんらく すぐに駆除！ すぐに連絡！ ～クビアカツヤカミキリにご注意ください～

クビアカツヤカミキリってどんな虫？

- ・全体的に光沢のある黒色で、胸部（クビ）が赤いカミキリムシです。
- ・サクラやウメ、モモ、スモモなどの樹木の中に入り、中を食い荒らしてしまいます。
- ・幼虫が入り込んだ樹木からは、うどん状のフラス（幼虫のフンと木くずが混ざったもの）が排出されます。

どんな影響がある？

- ・果実の生産量が低下したり、生態系に被害を及ぼしたりします。
- ・中を食い荒らされて弱った樹木が枯れて枝が落ち、木が倒れるなどして、人が怪我をしたり景観が悪化したりします。

【その他参考】BUZZ MAFF（農林水産省）動画「クビアカツヤカミキリにご用心！」→



成虫

5月末～8月頃に
かけて発生

頭からお尻まで
約2.5～4cm

幼虫・フラス



フラスの見分け方は裏面をご覧ください。

被害木



※成虫・被害木画像は環境省提供。幼虫・フラスの画像は環境省作成チラシ「クビアカツヤカミキリは、外来生物法に基づく特定外来生物に指定されています。」を加工して作成。

見つけたら・・・

- ① すぐに駆除※して、
- ② 市町村または県自然環境課までご連絡ください。

※殺虫剤を使用される場合は、農薬登録のあるものをご使用ください。




島根県環境生活部 自然環境課 自然保護係

TEL 0852-22-6377

E-mail : gairaiseibutsu@pref.shimane.lg.jp

～ フラスの見分け方～

クビアカツヤカミキリ




様々な太さのフラスが見られます。



・ 明るいオレンジ色～褐色で、薄い木の切片を多く含みます。

(参考) コスカシバ




・ 黒っぽい顆粒状のフンを多く含みます。

(参考) ゴマダラカミキリ



・ 色や形状、大きさはクビアカツヤカミキリに似ていますが、繊維状の木くずを多く含んでいます。



※画像はすべて東京都環境局提供。

クビアカツヤカミキリは、法律により、生きたままの飼育・運搬等が原則禁止されています。

その他、詳細情報等は島根県自然環境課ホームページをご覧ください。

